

Beckman Coulter si impegna a far progredire l'assistenza sanitaria per ogni persona. Grazie ad un approccio basato su scienza, tecnologia, passione e creatività dei nostri team supportiamo i laboratori diagnostici nel migliorare i risultati sanitari.

I nostri sistemi diagnostici vengono utilizzati per complessi test biomedici e si trovano in ospedali, laboratori e di studi medici in tutto il mondo.

Beckman Coulter offre una combinazione unica di persone, processi e soluzioni progettate per elevare le prestazioni dei laboratori clinici e delle reti sanitarie. Lo facciamo accelerando le cure con un menu clinicamente rilevante, portando a tutti i benefici dell'automazione, offrendo maggiori informazioni attraverso l'informatica clinica e creando valore all'interno dell'organizzazione attraverso il programma di Performance Partnership.

Azienda facente parte della Danaher Corporation dal 2011, Beckman Coulter ha sede a Brea, in California, e ha oltre 11.000 collaboratori in tutto il mondo che lavorano con passione per migliorare la salute delle persone.



OLTRE
4.9

MILIONI¹

Persone affette da sepsi al mondo

> 16.000€

COSTO PER PAZIENTE²

con sepsi in Terapia Intensiva

20-40%
TASSO MORTALITÀ³

> 2% DELLE
GIORNATE DI DEGENZA⁴

I NUMERI DELLA **SEPSI**

**ORA È DISPONIBILE UN
NUOVO INDICATORE PER
LA DIAGNOSI PRECOCE**

**TERAPIA CON
ANTIBIOTICI**

diminuisce la probabilità di decesso del

7.6%
PER ORA⁵

20% di pazienti con sepsi sono
riospedalizzati entro
30 GIORNI^{2,6}

UN TERZO

DI PAZIENTI DECEDUTI IN
OSPEDALE HANNO LA SEPSI⁷

E.BECKMANCOULTER.COM/UNITEDIN-SEPSIS

1. Rudd et al., "Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study" Lancet, 2020 Jan 18;395(10219):200-211.

2. LOTTA ALLA SEPSI - Call to Action DOCUMENTO DI INDIRIZZO Gruppo Tecnico Programma Regionale di Lotta alla Sepsis REGIONE TOSCANA.

3. La gestione della sepsi nell'adulto in pronto soccorso e medicina d'urgenza in Italia. Le raccomandazioni della consensus Simes. Italian Journal of Emergency Medicine 3/2018

4. Totale degenza in ospedale per acuti. Elaborazione dati su DMS 576, tab 2.26. Rapporto SDO 2018, <https://www.esccentro.it/sd/>

5. Kumar A, Roberts D, Wood KE et al., "Duration of Hypotension Before Initiation of Effective Antihypotensive Therapy is the Critical Determinant of Survival in Human Septic Shock." Crit Care Med, vol. 34, 2006, pp. 1589-96.4. Angus DC and van der Poll 2013. In Engl J Med 2013 Nov 21;369(21):2060

6. Sepsis Alliance, "Fast Shocks 2018." <https://www.sepsis.org/>. Accessed 6 Mar. 2019.

7. www.cdc.gov/sepsis/data/report/index.html

© 2020 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States and other countries. For Beckman Coulter's worldwide office locations and phone numbers, please visit www.beckmancoulter.com

Informazione destinata ad operatori sanitari

IT-HEME-ADV-G420-001

